

Изменение окраски нефрита Забайкалья

Нуриева Алена Александровна

студент

*Иркутский государственный технический университет, факультет геологии
геоинформатики и геоэкологии, Иркутск; Россия*

E-mail: alenanurieva@mail.ru

Проведены эксперименты по изменению окраски нефрита различных месторождений Забайкалья по методике предложенной ранее (Медведев, 1989). Эксперименты проводились в изобарно-изотермических условиях при температуре 500°C и давлении 1000 атм. в восстановительной (90%Н₂О+10%Н₂) и окислительной (90%Н₂О+10%О₂) атмосфере. Рабочей средой были смеси состава С – О – Н – F с различным соотношением компонентов.

В качестве исходных образцов были отобраны разноокрашенные нефриты ряда месторождений:

- Трещиноватые нефриты зеленого цвета различной тональности, а так же белые и серовато-белые с включениями кальцита, реже хлорита и гидроокислов железа Хамархудинского месторождения (Закаменский район Республики Бурятия).
- Нефриты белого, серого, светло- и темно-зеленого цветов Голубинского месторождения (Баунтовский район Республики Бурятия, долина р. Голубе).
- Табачный нефрит со следами ожелезнения Коркушидинского месторождения.
- Нефриты серого цвета с бледно-зеленым оттенком Кавоктинского месторождения (Баунтовский район Республики Бурятия, верховья р. Кавокта).
- Бледноокрашенный нефрит Хойтинского месторождения (Баунтовский район Республики Бурятия, русловые отложения р. Хойта).

Эксперименты показали, что выдержка бледноокрашенных образцов в восстановительных условиях приводит к улучшению декоративно-художественных свойств нефрита Кавоктинского, Хойтинского и Голубинского месторождения. Нефрит в результате обработки приобретает белую окраску с матовой поверхностью, неоднородной за счет отчетливо выраженных белых хлопьевидных включений. Табачный нефрит со следами ожелезнения Коркушидинского месторождения приобрел салатно-белый почти однородный оттенок.

Поскольку особенностью нефритовых месторождений является их уникальность, методика облагораживания некондиционного сырья требует своего уточнения для конкретных нефритовых проявлений.

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам Института земной коры СО РАН, Медведеву В. Я. и Ивановой Л. А. за оказанную помощь и поддержку, а также геологической компании «Сибкварцсамоцветы».

Литература:

1. Медведев В. Я., Иванова Л. А. Флюидальный режим нефритообразования – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 129 с.