

Анализ эффекта preconditionирования на компоненты крови при ишемии мозга методами флуоресцентной спектроскопии

Буравцов Дмитрий Евгеньевич (студент), **Власова Ирина Михайловна** (ассистент, кандидат физ. - мат. наук)

МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

e-mail: vlasovairina1979@mail.ru

В данной работе влияние ишемического preconditionирования на ткани головного мозга при глобальной ишемии исследовалось методами флуоресцентного анализа по оценке свободнорадикальных окислительных повреждений липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) крови.

Зарегистрировано увеличение (в 5,3 раза) интенсивности флуоресценции ($\lambda_{\text{возб}} = 350$ нм) образцов сыворотки крови после ишемии по сравнению с образцами здоровой сыворотки, что обусловлено свободнорадикальным окислением ЛПНП, приводящим к значительному повышению содержания в фосфолипидном слое ЛПНП продуктов перекисного окисления липидов. При исследовании флуоресценции сыворотки крови после ишемии с предварительным preconditionированием показано, что в этом случае интенсивность флуоресценции возрастает не сильно (в 3,1 раза) по сравнению с интенсивностью флуоресценции здоровой сыворотки.

Защитный эффект ишемического preconditionирования был зафиксирован также по результатам исследования флуоресцентных характеристик молекулярных зондов – родамина 6Ж и нильского синего.

Флуоресценция родамина в сыворотке крови животных после ишемии увеличивается по сравнению с флуоресценцией родамина в здоровой сыворотке. Интенсивность флуоресценции родамина в сыворотке крови после ишемии без preconditionирования больше (примерно в 1,5 раза) интенсивности флуоресценции родамина в здоровой сыворотке. Увеличение интенсивности флуоресценции родамина в сыворотке крови после ишемии связано с наличием свободнорадикальных липидных образований в ЛПНП. В образцах сыворотки крови после ишемии с preconditionированием интенсивность флуоресценции родамина возрастает в 1,3 раз по сравнению с интенсивностью флуоресценции родамина в здоровой сыворотке.

Нильский синий, являясь незаряженным гидрофобным зондом, имеет возможность проникновения внутрь фосфолипидного амфипатического слоя ЛПНП. Для анализа степени вязкости окружения зонда применен метод, состоящий в изучении эффекта, определяемого неоднородным уширением спектров. Во всех трех типах образцов сыворотки крови при увеличении длины волны возбуждения нильского синего наблюдается красный сдвиг максимума спектра флуоресценции, что указывает на проникновение молекул зонда внутрь вязкого фосфолипидного слоя ЛПНП сыворотки. Величина смещения спектров флуоресценции нильского синего в сыворотке крови после ишемии с preconditionированием близка по значению величине смещения спектров флуоресценции нильского синего в здоровой сыворотке.

Таким образом, с помощью методов флуоресцентной спектроскопии проведен анализ защитного эффекта ишемического preconditionирования на ткани головного мозга при глобальной ишемии по оценке окислительных повреждений компонентов крови. Защитный эффект preconditionирования может быть объяснен уменьшением развития необратимых клеточных повреждений головного мозга и ослаблением активности генерации кислородных радикалов при глобальной ишемии. Уменьшение образования активных форм кислорода в клетках тканей мозга при ишемии приводит к уменьшению их попадания в кровь и к уменьшению свободнорадикального повреждения компонентов крови.

* Авторы выражают глубокую признательность своему научному руководителю - профессору, доктору физ.-мат. наук Салецкому А.М. за оказанное внимание и помощь в выполнении работы.