

# Об электрической проводимости магнитных коллоидов с мелкодисперсным немагнитным наполнителем<sup>1</sup>

Халин Кирилл Анатольевич<sup>2</sup>

Студент

Ставропольский государственный университет, Ставрополь, Россия

E-mail: Halinkirill@rambler.ru

Влияние магнитного поля на электропроводность магнитных жидкостей (МЖ) является одной из актуальных проблем исследования таких сред. Добавление в МЖ немагнитных частиц значительно увеличивает анизотропию электрофизических свойств таких систем, что делает их еще более интересным объектом изучения.

Образцы для исследования электропроводности были приготовлены путем добавления в жидкость на основе керосина эбонитовых ( $\rho=1185 \text{ кг/м}^3$ ), графитовых ( $\rho=1690 \text{ кг/м}^3$ ) и алюминиевых частиц. Размер эбонитовых и алюминиевых частиц достигал 1–6 мкм, графитовых – от 1 до 10 мкм.

Оказалось, что электрическая проводимость исследованной МЖ с алюминиевым и графитовым наполнителем существенным образом зависит от величины и направления (по отношению к направлению линий тока) магнитного поля. Ранее подобные результаты приводились в работе [1], в которой исследовалась магнитная жидкость с непроводящими частицами. При малых концентрациях частиц проводимость слоя исследуемой среды уменьшается при повышении напряженности магнитного поля в случае его ориентации перпендикулярно напряженности электрического поля (линиям тока) и увеличивается, когда направления магнитного и электрического полей




Рис. 1. Зависимость проводимости магнитной жидкости с графитовым наполнителем ( $c=25\%$ ) от величины

совпадают. Разность между максимальным и минимальным значениями измеренной таким образом проводимости зависит от объемного содержания немагнитных частиц.

Воздействие магнитного поля на электропроводность МЖ с содержанием больших объемных концентраций проводящих частиц не приводит к монотонному изменению проводимости. Как видно из рисунка 1, график зависимости проводимости от величины магнитного поля в случае совпадения линий тока и направления поля имеет максимум (кривая 1), если же направления перпендикулярны, то наблюдается

минимум (кривая 2). Очевидно, что механизм проводимости для магнитных жидкостей с большими концентрациями немагнитных проводящих частиц имеет несколько иной характер, чем предложенный ранее в [2]. Следует предположить, что с увеличением концентрации проводящих частиц линии тока перестают огибать поверхность этих частиц и проходят через них. Таким образом, сам наполнитель становится проводником носителей тока в данной системе.

## Литература

1. Халин К.А. Особенности электрофизических свойств магнитных жидкостей с немагнитным наполнителем. Материалы конференции ВНКСФ-12, 2006.
2. Духин С.С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. Киев, 1975.

<sup>1</sup>Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках научно-технической программы «Развитие научного потенциала Высшей школы».

<sup>2</sup>Автор выражает признательность профессору, д.ф.-м. н. Диканскому Ю.И. за помощь в подготовке тезисов.