

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА И ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ СОН (ПС) ¹

*Евдокименко Анна Николаевна, Русакова Ирина Михайловна, Руцкова Елизавета Михайловна, Фесенко Галина Николаевна, Ковальзон Владимир Матвеевич
Студентка, студентка, аспирантка ИВНДиНФ РАН, м.н.с., д.б.н.*

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет
Фундаментальной Медицины, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова
РАН, Москва, Россия*

E-mail: fortune83@mail.ru

Ишемизация головного мозга крыс с помощью каротидной окклюзии является распространенной моделью инсульта человека. С целью проверки гипотезы о том, что активация репаративных функций ЦНС, вызванная хронической ишемизацией, связана с усиленным функционированием механизмов ПС, проведена серия сомнографических и нейроморфологических исследований. Изучена динамика цикла сон-бодрствование у экспериментальных животных в ходе пост-ишемического восстановления. Исследование проведено на крысах, переживших снижение кровотока в виллизиевом круге, которое осуществлялось перевязкой и последующей перерезкой одной общей сонной артерии под наркозом (хлорал-гидрат, 0,5 г/кг, в/б). Предварительно крысам вживляли электроды для записи ЭЭГ коры и гиппокампа, а также ЭМГ. Непрерывную полисомнографическую регистрацию проводили у 4 животных одновременно в условиях свободного поведения в экспериментальных камерах и светового режима 12/12. Результаты сравнивали с контрольными показателями у следующих групп: (1) тех же животных в фоне (до окклюзии) - предварительный контроль; (2) контрольных животных, у которых операция вживления электродов сочеталась лишь с начальным этапом окклюзии, ограничивавшемся только доступом к сонным артериям - параллельный контроль. Обнаружено достоверное увеличение представленности ПС в светлый («дневной») период суток, достигавшее максимума на 5-й-7-й день после окклюзии, после чего плато удерживалось на протяжении 2-3 недель и затем претерпевало медленный спад к контрольному уровню. При этом в темный («ночной») период процент ПС не изменялся или уменьшался. Что касается медленноволнового сна (МС), то его представленность возрастала лишь в первые три дня (светлые периоды суток) после окклюзии - по типу «отдачи». Морфологический анализ (окраска 6 мкм срезов по методу Ниссля) показал, что на стороне окклюзированной артерии наблюдались компактные скопления пикнотических дегенерирующих нейронов. Поражения наблюдались в основном в коре больших полушарий, и в меньшей степени касались стрио-паллидарной системы. Проводится изучение 3 различными методами динамики репаративных процессов в головном мозге в условиях хронической ишемии для сопоставления гистологических и электрофизиологических данных.

¹ Тезисы доклады основаны на материалах исследований, проведенных в рамках программы Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине» и гранта РГНФ №04-0600242а.