

Потенциал-управляемый K^+ ток в артериях крыс содержит существенный компонент относящийся к $K_{v\alpha 2}$ субъединице

Лысенко Н.Н.

*к.б.н., докторант кафедры фундаментальной и прикладной физиологии РГМУ
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет, кафедра
фундаментальной и прикладной физиологии, Москва, Россия.*

E-mail: fraunata@yandex.ru

Потенциал-управляемые калиевые каналы (K_v) играют важнейшую роль в регулировании сокращения и расслабления сосудов маленького калибра. Экспрессия субъединиц $K_{v\alpha 1}$ и $K_{v\alpha 2}$ потенциал-управляемых K^+ каналов ранее была обнаружена в мелких сосудах различных животных (кролик, мышь, крыса), однако, вклад этих субъединиц в общий K^+ ток плохо изучен.

Таким образом, нами была проверена гипотеза, что ток через $K_{v\alpha 2}$ субъединицу является существенным компонентом выходящего K^+ тока в мелких мозговых артериях крыс линии Wistar.

Для регистрации K^+ тока на мембране свежеизолированных гладкомышечных клеток мозговых артерий крыс линии был использован метод patch-clamp в конфигурации whole-cell. Для исследования $K_{v\alpha 2}$ субъединицы был использован специфический блокатор stromatoxin. Показано, что $K_{v\alpha 2}$ ток ингибировался на 50% при концентрации вещества 36 nM, а максимально stromatoxin ингибировал общий K^+ ток на 61,2%. В концентрации 100 nM stromatoxin оказывал быстрое обратимое ингибирование K^+ тока на мембране гладкомышечной клетки. Полумаксимальная активация при исследовании контрольного тока наблюдалась при потенциале -4.4 ± 1.9 mV, slope 12.1 ± 0.9 mV (n=10), а в присутствии 100 nM stromatoxin эта величина составила -6.2 ± 2.3 mV, slope 12.3 ± 1.0 mV (n=10) (P=ns). Значение потенциала полумаксимальной инактивации в отсутствие stromatoxin составило -37.9 ± 1.4 mV, slope 9.3 ± 0.5 mV (n=10). В присутствии 100 nM stromatoxin значение потенциала полумаксимальной инактивации несколько отличалось от контрольного и составило -45.1 ± 2.5 mV, slope 7.7 ± 0.7 mV (n=10) (P<0.05). Временная константа (τ) снятия инактивации K^+ тока в контроле составила 2.14 ± 0.24 s (n=10), а в присутствии 100 nM stromatoxin значение τ равно 2.12 ± 0.20 s (n=10).

Из результатов следует, что присутствие строматоксин-сенситивного K^+ тока, в большей степени, определяется наличием $K_{v\alpha 2}$ субъединицы в изолированных гладкомышечных клетках мелких мозговых артерий крыс линии Wistar.