

Современное состояние наземной малакофауны Внутригорного Дагестана

Научный руководитель – Магомедова Мадина Зайирбеговна

Магомедова Патимат Камильевна

Студент (бакалавр)

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

E-mail: m653101@mail.ru

Несмотря на то, что казалось бы современное состояние наземной малакофауны Дагестана изучено сравнительно хорошо, все же остается открытым вопрос о видовом составе наземных моллюсков отдельных его районов. На сегодняшний день нами была поставлена цель уточнить видовой состав наземных моллюсков Внутригорного Дагестана, представляющего собой сложную горную территорию, занимающую западную и центральную его часть от 800 до 2800 метров.

По итогам проведенных собственных сборов и наблюдений нами было выявлено для района исследования 20 видов наземных моллюсков, относящихся к 17 родам 12 семействам:

1. *Cochlicopa lubrica* (Muller, 1774)
2. *Cochlicopa nitens* (Gallenstein, 1852)
3. *Vallonia costata* (Muller, 1774)
4. *Vallonia pulchella* (Muller, 1774)
5. *Pyramidula rupestris* (Draparnaud, 1801)
6. *Euxina strumosa* (L. Pfeiffer, 1848)
7. *Discus ruders* (Ferussac, 1821)
8. *Oxychilus subfusus* (O. Boettger, 1879)
9. *Phenocolimax annularis* (Studer, 1820)
10. *Zonitoides nitidus* (Muller, 1774)
11. *Euconulus fulva* (Muller, 1774)
12. *Deroceras agreste* (Linnaeus, 1758)
13. *Cepaea vindobonensis* (C. Pfeiffer, 1828)
14. *Xeropicta derbentina* (Krynicky, 1836)
15. *Fruticocampylaea narzanensis* (Krynicky, 1836)
16. *Kalitinaia crenimargo* (L. Pfeiffer, 1848)
17. *Shileykoa daghestana* (Kobelt, 1877)
18. *Stenomphalia pisiformis* (L. Pfeiffer, 1848)
19. *Stenomphalia selecta* (Klika, 1893)
20. *Hesseola solidior* (Mousson, 1873)

Материал собирался и обрабатывался по стандартным методикам. При определении использовались общие определители. Всего на территории Внутригорного Дагестана из 12 семейств самым многочисленным по количеству видов можно назвать семейство *Hygromiidae* Tryon, 1886, к которому относится треть видового состава представленной группы - 7 видов наземных моллюсков из 6 родов. Все остальные 11 семейств: *Cochlicopidae* Pilsbry, 1900, *Valloniidae* Morse, 1864, *Pyramidulidae* Kennard et Woodward, 1914, *Clausilidae* Gray, 1855, *Discidae* Thiele, 1931, *Zonitidae* Morch, 1864, *Vitrinidae* Fitzinger, 1833, *Gastrodontidae* Tryon, 1868, *Euconulidae* H. Baker, 1928, *Helicidae* Rafinesque, 1815 включают в свой состав всего по одному роду. В свою очередь родовой спектр распределения дагестанской наземной малакофауны показал также, что из 17 представленных на исследуемой территории родов 14 включают в свой состав всего лишь по одному виду.