

Апоптоз гиппокампальных нейронов у крыс линии Крушинского-Молодкиной

Научный руководитель – Черниговская Елена Валерьевна

Куликов Алексей Андреевич

Студент (магистр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Биологический факультет,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: alekskulikova95@gmail.com

Гиппокамп является одной из ключевых структур мозга участвующих в формировании эмоций и памяти. У крыс линии Крушинского-Молодкиной (КМ) при аудиогенных припадках гиппокамп первоначально не участвует в формировании клонико-тонических судорог. Однако после многократных судорог у крыс линии КМ возникает миоклонический гиперкинез или спонтанные судороги, в основе которых лежит возбуждение возникающее в новой коре и гиппокампе (Семиохина, Федотова, & Полетаева, 2006).

Давно стоял вопрос о причинах и следствиях потери нейронов: судороги ли приводят к гибели нейронов, гибель нейронов приводит к судорогам или оба этих утверждения верны? Во многих моделях эпилепсии подтверждаются, что эпилептическая активность ведет к клеточной гибели (Pollard, Charriaut-Marlangue, Cantagrel, Represa, & Robain, 1994; Roux et al., 1999).

Данные касательно причинности возникновения судорог остаются противоречивыми. При использовании антагониста NMDA-рецепторов, который способен редуцировать повреждение нейронов при судорогах, спонтанные эпилептические припадки все равно развиваются (Brandt, Potschka, Löscher, & Ebert, 2003). Однако, как было показано позже, уменьшение повреждения пирамидных нейронов поля СА3 гиппокампа приводит к уменьшению продолжительности судорог у мышей 2 раза (Jimenez-Mateos et al., 2008). Поэтому модулирование и исследование клеточной гибели может являться перспективным направлением исследования для предотвращения ухудшения приступов эпилепсии.

В работе проведено сравнение крыс линии Вистар и КМ в возрасте 14 дней (формирование судорожной готовности) и трех месяцев (уже сформированная судорожная готовность). Также для выяснения характера влияния судорожной активности на апоптоз в гиппокампе были проанализированы крысы линии КМ с разной степенью эпилептизированности мозга (крысы линии КМ, перенесшие однократный припадок и крысы, перенесшие 7 припадков в течение 7-ми дней).

В гиппокампе интактных крыс линии КМ по сравнению с крысами линии Вистар не наблюдается усиления гибели нейронов. У интактных крыс линии КМ уровень экспрессии и активности проапоптозных белков не отличался от характерного для крыс линии Вистар. При этом содержание и активность Bcl2 у крыс КМ понижены. С помощью метода TUNEL было показано усиление апоптоза и в зубчатой извилине и в СА3 поле гиппокампа при многократных судорогах. При этом число ГАМК-ергических нейронов в зубчатой извилине не уменьшается, возможно, за счет увеличения экспрессии и активности антиапоптозного белка Bcl2. Показано, что при многократных судорогах в гиппокампе происходит активация митохондриального и р53 зависимых путей запуска апоптоза (увеличение содержания цитохрома C, увеличение содержания и активности белка р53), но при этом наблюдается увеличение активности Bcl2, что очевидно, препятствует массовой гибели клеток в других отделах гиппокампа.

На 15 день постнатального развития крыс линии КМ методом Tunel в гиппокампе не обнаружено апоптотической гибели нейронов, несмотря на активацию митохондриального

пути запуска апоптоза. Уровень синтеза и активности p53 и Bcl2 у крысят линии КМ ниже, чем у крыс Вистар этого возраста. Полученные данные указывают на возможное участие апоптотической гибели нейронов в нарушении развития гиппокампа у крыс линии КМ.

Таким образом мы показали, что гиппокам хоть и включается в формирование судорог на поздних стадиях эпилептизации, паталогические процессы происходят в нем уже на самых ранних этапах эпилептогенеза.

Источники и литература

- 1) Семиохина, А. Ф., Федотова, И. Б., Полетаева, И. И. (2006). Крысы линии Крушинского-Молодкиной: исследования аудиогенной эпилепсии, сосудистой патологии и поведения. Журнал Высшей Нервной Деятельности Им. И.П. Павлова, 56(3), 298–316.
- 2) Brandt, C., Potschka, H., Löscher, W., & Ebert, U. (2003). N-methyl-D-aspartate receptor blockade after status epilepticus protects against limbic brain damage but not against epilepsy in the kainate model of temporal lobe epilepsy. *Neuroscience*, 118(3), 727–740.
- 3) Jimenez-Mateos, E. M., Hatazaki, S., Johnson, M. B., Bellver-Estelles, C., Mouri, G., 56 Bonner, C., ... Henshall, D. C. (2008). Hippocampal transcriptome after status epilepticus in mice rendered seizure damage-tolerant by epileptic preconditioning features suppressed calcium and neuronal excitability pathways. *Neurobiology of Disease*, 32(3), 442–453.
- 4) Roux, P. P., Kennedy, T. E., Roux, P. P., Colicos, M. A., Barker, P. A., & Kennedy, T. E. (1999). p75 neurotrophin receptor expression is induced in apoptotic neurons after seizure. *The Journal of Neuroscience*, 19(16), 6887–6896.
- 5) Pollard, H., Charriaut-Marlangue, C., Cantagrel, S., Represa, A., & Robain, O. (1994). Kainate-induced apoptotic cell death in hippocampal neurons. *Neuroscience*, 63(1), 7–18.