

Мониторинг адаптации экзотического вида красноухой черепахи (*Trachemys scripta elegans*) в окрестностях г.о. Нальчика

Моллаева А.Б.¹, Кулиева Т.Д.²

1 - Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова, Институт химии и биологии, Нальчик, Россия, E-mail: mollaeva.amina@rdebc.ru; 2 - Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова, Институт химии и биологии, Нальчик, Россия, E-mail: a_a_t_i@hotmail.com

Актуальность работы: В небольшом биотопе даже небольшое количество красноухих черепах может нанести серьезный урон аборигенным организмам, актуально изучение экологической опасности красноухих черепах как инвазивного вида экосистемы КБР. Эта ситуация обостряется в урбанизированной среде, где обычно и происходит попадание красноухих черепах в природные экосистемы [1,2]. **Цель исследования:** мониторинг красноухих черепах в окрестностях г. Нальчика. **Задачи:** предложить математические способы мониторинга состояния красноухих черепах. Выявить причину гибели болотных и красноухих черепах в сезон осень-зима 2016-17года. **Объект исследования:** озера антропогенного происхождения. **Методы исследования:** мониторинг численности и биометрия; «метод наименьших квадратов». **Результаты и выводы:** Предметом исследования является сообщество черепах *Emys orbicularis* и *Trachemys scripta*, обитающих на территории ЭБЦ, в пруду искусственного происхождения. Анкетирование в соцсетях эпидемиологическую опасность красноухих черепах не выявил; чужеродный вид вытесняет аборигенов с дефицитных мест баскинга; термобиологические ограничения распространения вида *T. scripta elegans* в условиях КБР действуют в период размножения красноухих черепах. Зимой этого года большая часть красноухих черепах погибла. Причиной гибели оказался температурный режим с резкими перепадами температуры. При оценке общего состояния черепах особенно важно определить массу тела и ее соответствие нормам. Для некоторых видов взрослых среднеазиатских черепах были предложены так называемые «кривые Джексона», показывающие нормальное соотношение массы черепахи и длины ее панциря $0,3 L^3$ [4]. Мы провели диагностику физиологического состояния черепах с применением метода наименьших квадратов и вывели «свою» «кривую Джексона» $M = 0,2 L^3$ для красноухих черепах [3]. На практике традиционные методы исследований наиболее затруднены из-за особенностей физиологии и наличия панциря. Мы предлагаем предварительный метод, который можно применять в рутинной практике.

Источники и литература

- 1) Ильях М. П. Красноухая черепаха, *Trachemys scripta* – новый вид герпетофауны Ставропольского края – Биологические науки «Наука. Инновации. Технологии» №3, 2014
- 2) Семенов Д.В. Красноухая черепаха, *Trachemys scripta elegans*, как инвазивная угроза (Reptilia, Testudines)/ Семенов Д.В – М.: Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 2009 г.
- 3) Тлиашинова С., Кулиева Т. К вопросу адаптации тропического вида красноухих черепах в условиях Северного Кавказа / Материалы 47-ой студенческой научной конференции «Актуальные проблемы медицины глазами студентов-медиков» КБГУ/ КБГУ им. Х.М.Бербекова, 2016 С.112-116.
- 4) Болезни черепах и их профилактика / -2006г. <http://www.vetpomosh.ru>