

Влияние микробиоты на сенсорно-моторную функцию мышей

Научный руководитель – Яковлева Ольга Владиславовна

Арсланова А.Н.¹, Рудич М.П.²

1 - Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины и биологии, Казань, Россия; 2 - Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины и биологии, Кафедра биоинформатики и медицинской кибернетики, Казань, Россия

Кишечная микрофлора - это сообщество бактерий, которые помогают поддерживать динамическое и метаболическое равновесие в организме. [1] Изменение микробиоты нарушает функционирование иммунной системы и способствует различным заболеваниям. Состав микрофлоры изменяется при таких заболеваниях, как депрессия, синдром раздражённого кишечника и аутизм. [2] Относительное изобилие и разнообразие микробиоты существенно влияет на развитие мозга.

Целью данного исследования было сравнение сенсорно-моторной функции мышей в контроле и при изменённой микробиоте.

Объектом исследования были мыши в возрасте 20-25 дня жизни. Мыши были разделены на 3 группы: 1) контрольная группа, получавшая инъекции физиологического раствора (К, n=10); 2) группа мышей, получавших инъекции антибиотиков (АБ, n=10); 3) группа мышей, получавших инъекции антибиотиков и с добавлением в питьевую воду лактобацилл (АБ+ЛБ, n=10). Внутривентрикулярные инъекции антибиотиков (коктейль из неомидина, ванкомицина, амфотерицина В, ампициллина, метронидазола) и добавление лактобацилл в питьевую воду (4×10^6 кл/мл) проводили в течении 2-х недель.

Для оценки функций мышечной системы мышей использовали тесты: «Открытое поле», где подсчитывали горизонтальную и вертикальную двигательную активность (ГДА и ВДА), и «Ротарод», характеризующий координацию движений и выносливость животного. Тесты проводились до начала и сразу после окончания курса инъекций. Статистический анализ проводился с помощью непараметрического теста Kruskal-Wallis ANOVA.

Результаты. У мышей АБ группы наблюдалось увеличение ГДА ($166,1 \pm 53,3$ о.е.) по сравнению с начальными значениями ($128,0 \pm 14,7$), контрольной ($121,3 \pm 11,6$) и АБ+ЛБ группами ($106,9 \pm 13,9$). ВДА в АБ группе ($10,4 \pm 2,4$ о.е.) была ниже по сравнению с начальными значениями ($12,5 \pm 1,7$), контрольной ($11,2 \pm 2,8$) и АБ+ЛБ группами ($13,7 \pm 3,0$). Время пребывания на вращающемся цилиндре в тесте «Ротарод» увеличивалось во всех группах относительно начальных значений: Контроль - $70,8 \pm 24,2$ с, АБ - $61,0 \pm 23,2$ с, АБ+ЛБ - $65,6 \pm 23,0$ с). В группе АБ в конце курса инъекций время пребывания на вращающемся цилиндре было ниже ($83,6 \pm 23,9$ с), чем в контрольной и АБ+ЛБ группах ($100,5 \pm 24,4$ и $101,3 \pm 16,8$ с, соответственно).

Выводы. Таким образом, нарушение нормальной микробиоты кишечника при введении антибиотиков ведёт к снижению выносливости и нарушению координации движений у мышей в тесте «Ротарод». При этом наблюдается увеличение горизонтальной двигательной активности и не изменяется вертикальная двигательная активность животных. Одновременное введение лактобацилл и инъекций антибиотиков предотвращало наблюдаемые изменения, что свидетельствует о положительном эффекте нормальной микрофлоры на сенсорно-моторную функцию мышей.

Источники и литература

- 1) Hong-Xing Wang, Yu-Ping Wang. Gut Microbiota-brain Axis // Chinese Medical Journal, October 5, 2016, Volume 129, Issue 19.

- 2) Camila Barrera-Bugueno, Ornella Realini, Jorge Escobar-Luna, Ramon Sotomayor-Zorate, Martin Gotteland, Marcela Julio-Pieper, Javier A. Bravo. Anxiogenic effects of a Lactobacillus, inulin and the synbiotic on healthy juvenile rats // Neuroscience, 17 September 2017, Volume 359, Pages 18-29.