

Секция «Качественные и количественные методы исследования в психологии»

Исследование феномена фершробен в клинической психологии

Научный руководитель – Ениколопов Сергей Николаевич

Атаджыкова Юлия Акмурадовна

Аспирант

Научный центр психического здоровья РАМН, Москва, Россия

E-mail: at.julia@gmail.com

Понятие «фершробен» (*Verschrobenheit*) пришло в науку из обыденной речи и в первый раз было использовано Л. Бинсвангером в 1952 году. Уже тогда клиницисты предлагали различные точки зрения на природу этого феномена. Так, ряд психиатров относили этот феномен к кругу эндогенных заболеваний [7; 8], в то время как другие придерживались мнения о конституциональной природе чужаковатости [9]. В дальнейшем исследование этой категории личностей, характеризующихся чужаковатым поведением с чертами аутизма и шизоидности, привело к формулированию понятия «шизотипия» - категории гораздо более широкой и, как следствие, гетерогенной [10; 11].

В отечественной клинической науке продолжительный период времени доминирующей оставалась точка зрения о принадлежности категории шизотипии к кругу эндогенных расстройств, которая формулировалась в понятии «дефект типа фершробен при шизофрении» [2; 5]. Однако в последние годы в связи с экстенсивным исследованием зарубежными клиницистами понятия шизотипии в России ведутся разработки новой модели - изменений типа фершробен [4; 1]. Эта модель позволяет рассмотреть феномен фершробен как самостоятельный и выйти за рамки понимания его как типа дефекта при шизофрении, а также уточнить понятие шизотипии в контексте накопленных в отечественной науке клинических данных и сопоставления их с опытом зарубежных коллег [6]. Предлагаемая модель является медицинской, а выделенная авторами структура феномена фершробен соответствует основным измерениям шизотипии [6].

Исследование феномена фершробен как самостоятельного является в определенной степени инновационным, поскольку до сегодняшнего дня это понятие использовалось исключительно для описания психопатоподобного дефекта при шизофрении [5]. В отечественной клинической психологии в свете недостаточного количества публикаций, посвященных шизотипии или явлениям чужаковатости, обсуждаемый феномен может являться предметом лишь эксплораторного исследования. В связи с этим при постановке вопроса о методическом аппарате, допускающем психологическое исследование феномена фершробен было обнаружено, что методический инструментарий в этой области оказывается ограниченным. В отечественной психологии единственной доступной методикой для измерения шизотипических черт является опросник SPQ-74, апробированный А.Г. Ефремовым и С.Н. Ениколоповым, который и стал основной методикой настоящего исследования [3; 12].

Проведение психологического исследования имело две основные цели: 1) утверждение явлений круга фершробен в качестве самостоятельных через доказательство их концептуального соответствия измерениям шизотипии, и 2) подтверждение эффективности методики SPQ-74 для количественной оценки изменений типа фершробен.

В исследовании принял участие 51 пациент (18 мужчин и 33 женщины; средний возраст - $44,8 \pm 8,5$ года; с диагнозами F21, F20.6 по МКБ-10). Сравнение проводилось с двумя выборками: условно здоровых испытуемых и пациентов с шизофренией. При обработке данных использовался пакет статистических программ SPSS 23.

Результаты исследования подтвердили содержательное соответствие структуры синдрома фершробен дименсиям шизотипии, что, в свою очередь, подтверждает самостоятельность феномена фершробен. Наряду с этим были выявлены трудности количественного измерения изменений типа фершробен в сравнении с контрольными выборками, что не позволяет на данном этапе утвердить эффективность применения SPQ-74 для диагностики и измерения выраженности изменений типа фершробен в российской популяции.

Полученные результаты позволяют наметить путь дальнейшего изучения изменений типа фершробен и поставить ряд теоретических и методических задач, в том числе вопрос о возможности использования методик другого типа - методов клинической оценки, что позволяет нивелировать ряд слабостей, характерных для опросниковых методов. Совершенствование методического аппарата для психологического исследования феномена фершробен представляется необходимым как для уточнения разрабатываемой отечественными клиницистами модели, так и для успешной интеграции этого понятия в концепцию шизотипии.

Источники и литература

- 1) Атаджыкова Ю.А., Ениколопов С.Н. От феномена шизотипии к синдрому «фершробен»: историческая перспектива и актуальные проблемы // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика: электронный научный журнал. М., 2016. No. 4(14). [Электронный ресурс]. URL: <http://medpsy.ru/climp> (дата обращения: 27.02.2018).
- 2) Воробьев В. Ю. Шизофренический дефект (на модели шизофрении, протекающей с преобладанием негативных расстройств): автореф. дис. ... д-ра мед.наук. Москва, 1988.
- 3) Ефремов А.Г., Ениколопов С.Н. Апробация методики выявления степени выраженности шизотипических черт (SPQ-74) // Материалы Первой Международной конференции, посвященной памяти Б.В. Зейгарник. Москва, 2001. С. 109-112.
- 4) Мухорина А.К., Атаджыкова Ю.А. Изменения типа «фершробен» при шизофрении и расстройствах шизофренического спектра // Материалы III-ей Всероссийской Констромской школы молодых ученых и специалистов в области психического здоровья. Москва: ФГБНУ НЦПЗ, 2016. С. 40-44.
- 5) Смулевич А.Б. Расстройства шизофренического спектра в общемедицинской практике // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. No. 1. С. 4-9.
- 6) Смулевич А.Б., Романов Д.В., Мухорина А.К., Атаджыкова Ю.А. Феномен «фершробен» при шизофрении и расстройствах шизофренического спектра (аспекты типологической дифференциации) // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017. No. 1. С. 5-17.
- 7) Binswanger L. Verschrobenheit // Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie. 1954. Vol. 127. P. 127-152.
- 8) Kahn E. Die verschrobenen Psychopathen. Handbuch der Geisteskrankheiten. Berlin, 1928. P. 448-460.
- 9) Kraepelin E. Psychiatrie, 8. Aufl. Bd. IV, Teil III. Leipzig. 1915.
- 10) Lenzenweger M.F. Schizotypy: An Organizing Framework for Schizophrenia Research // Current directions in psychological science. 2006. No. 15(4). P. 162-166.

- 11) Meehl P.E. Toward an integrated theory of schizotaxia, schizotypy and schizophrenia // Journal of Personality Disorders. 1990. Vol. 4. P. 1-99.
- 12) Raine A. The SPQ: A Scale for the Assessment of Schizotypal Personality Based on DSM-III-R Criteria // Schizophrenia Bulletin. 1991. Vol. 17(4). P. 555-564.