

К вопросу о распространенности и частоте выявлений спинномозговых грыж у лиц, проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа

Торосян Игорь Самвелович

Студент (специалист)

Пятигорский медико - фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, Кафедра экономики и организации здравоохранения и фармации, Пятигорск, Россия

E-mail: istorosyan@mail.ru

Вопросы своевременности и тактики ведения пациентов с заболеваниями спинного мозга, не зависимо от гендерно-возрастной характеристики реципиентов, неоднократно поднимаются на различных съездах, симпозиумах, конференциях и круглых столах как в среде узких специалистов нейрохирургического профиля, так и среди специалистов, осуществляющих общий прием в учреждениях первичного звена системы здравоохранения. Наиболее «часто» встречаемой патологией, по данным литературных источников за последние пятнадцать лет, среди нозологий, относящихся к вышеуказанной группе, является «спинномозговая грыжа». Этот факт подтверждается и данными, полученными из форм строгой статистической отчетности учреждений системы здравоохранения, предоставленных Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Медицинским информационным аналитическим центром Министерства здравоохранения Ставропольского края (ГБУЗ МИАЦ МЗ СК). При этом следует отметить тот факт, что на характер, локализацию и причины формирования «спинномозговой грыжи» влияет большое количество факторов, одним из которых является региональное эко-территориальное зонирование данной патологии с учетом медико-демографической составляющей той или иной местности. Именно с этих позиций базой, для проводимого нашей исследовательской группой исследования, был выбран крупный субъект Российской Федерации - Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО).

Анализ частоты встречаемости данной патологии на территории СКФО показал, что в зависимости от территории, процентное соотношение «врожденных» и «приобретенных» спинномозговых грыж достаточно вариабельно. Однако, общая картина частоты встречаемости всех форм данной нозологии специализирована и носит индивидуальный характер для каждого конкретного территориального образования, входящего в состав СКФО. Так, проведенное ранжирование территорий (по данным статистики ГБУЗ МИАЦ МЗ СК) свидетельствует о том, что максимальное количество лиц, имеющих впервые выявленную «спинномозговую грыжу», проживает на территории Республики Северная Осетия-Алания ($25,6 \pm 1,08\%$); на втором месте - республика Дагестан ($22,7 \pm 0,81\%$); на третьем - Чеченская республика ($19,3 \pm 0,62\%$); на четвертом и пятом - республика Ингушетия и Ставропольский край ($12,8 \pm 0,53\%$ и $11,7 \pm 0,12\%$ соответственно); на шестом - Кабардино-Балкарская республика ($10,8 \pm 0,54\%$). Минимальное количество лиц с впервые выявленным/установленным диагнозом «спинномозговая грыжа» фиксируется на территории Карачаево-Черкесской республики ($5,96 \pm 0,18\%$) СКФО.

Полученные данные требуют более глубокого анализа и организационно-методологического обоснования с позиций доказательной медицины, но наша исследовательская группа уверена, что данное исследование является актуальным и может послужить основой для формирования блока одной из региональных целевых программ, реализуемых Министерством здравоохранения.