

О необходимости изучения распространенности и тактике лечения лиц с новообразованиями ротовой полости на идентичных территориях Узбекистана и Российской Федерации

Научный руководитель – Бобровский Игорь Николаевич

Хотамов М.Б.¹, Холиков Т.Р.¹, Борзова Е.С.¹

1 - Пятигорский медико - фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, Кафедра экономики и организации здравоохранения и фармации, Пятигорск, Россия

В настоящее время проблемы заболеваний пародонта занимают ведущие позиции среди всех заболеваний стоматологического профиля. Особую группу среди данной категории составляют гиперплазии десен. Не смотря на низкую частоту выявления гиперплазий у различных групп населения, особый интерес у экспертов нашей исследовательской группы вызвал фиброматоз десен. Распространенность фиброматозом ежегодно возрастает, начиная приблизительно с 1-2 лет и остается относительно высокой на протяжении всей жизни. Анализ имеющихся реферативных баз данных показал, что изучением фиброматоза десен занималось большое количество исследователей, но патогенез, особенности распространения, факторы влияющие и причины появления данной нозологии до сих пор не уточнены. Тем более, что данное заболевание встречается у представителей любой гендерно-возрастной и этническо-социальной категории лиц.

Целью данного международного исследования стало изучение особенностей выявления и тактики ведения пациентов с данной нозологической единицей. Для обеспечения достоверности полученных результатов были сформированы две независимые экспертные группы, работающие одновременно на близких по медико-демографическим и территориально-экономическим показателям территориям двух независимых государств (Российская Федерация - территория Северо-Кавказского Федерального Округа и Узбекистан - территория Ферганской Долины). В ходе проводимого исследования произведена выкапировка и проанализировано 1082 формы строгой статистической отчетности (526 и 556 формы (РФ и Узбекистан соответственно)). Проведенное медико-статистическое исследование свидетельствует об отсутствии репрезентативных количественных и качественных различий между двумя независимыми территориальными целостностями. Однако при этом отмечаются достоверные различия по частоте распространенности ($2,16 \pm 0,1\%$ - на территории РФ и $1,73 \pm 0,04$ - Узбекистан соответственно) и количестве впервые выявленной патологии данной нозологической единицы (например, только за первый квартал 2017 года - 10 и 8 случаев соответственно).

В ходе анализа структуры и методов, применяемых в терапии фиброматоза десен, то распределение между оперативными и терапевтическими методами лечения по двум данным странам распределились следующим образом: на территории Российской Федерации - доля оперативного вмешательства составила $17,23 \pm 0,04\%$, терапии - $81,2 \pm 0,05\%$, нетрадиционных и/или инновационных методов - $1,56 \pm 0,07\%$; на территории Узбекистана - $20,36 \pm 0,04\%$, $75,18 \pm 0,43\%$ и $4,51 \pm 0,64\%$ соответственно профилю. Все полученные данные систематизированы и внедрены в единую электронную базу данных, внедренную в первичное звено систем здравоохранения соответствующих стран. При этом данные, используемые в работе экспертного совета нашей исследовательской группы являются репрезентативными и достоверными ($p \leq 0,05$) и могут быть использованы в генеральной совокупности случаев выявления данных форм нозологических единиц.