

Современные методы диагностики ишемической болезни сердца

Научный руководитель – Неджафова Екатерина Олеговна

Зайцева Анна Игоревна

Студент (специалист)

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова,
Москва, Россия

E-mail: anna-zajceva-97@mail.ru

Введение: Ишемическая болезнь сердца - одна из наиболее значимых проблем здравоохранения на сегодняшний день. Это подтверждают данные публикационной активности научной электронной библиотеки Elibrary: более 13000 публикаций за последние 10 лет. Для успешного лечения и предупреждения данного заболевания необходимо изучение новых взглядов на его этиологию. **Цель:** Анализ современных взглядов на этиологию ишемической болезни сердца. **Материалы и методы:** Электронная база научной литературы Elibrary, Cyberleninka. **Результаты:** Рассмотрены генетические, иммунологические и инфекционные факторы развития ишемической болезни сердца. С целью установления связи между обнаруженными антителами к миокарду и выраженностью клинических проявлений у 25 пациентов изучали показатели иммуноглобулинов А и G к кардиомиозину до и после лечения. После проведенного стандартизированного лечения отмечалось их уменьшение[1]. На основании генетического типирования показана связь развития заболевания с генами липидного обмена: апополипротеина Е, липопротеиновой липазы, белка-переносчика этерифицированного холестерина, геном, ассоциированным с ожирением, а также геном ангиотензиногена[2],[3]. Наиболее изучены с точки зрения инфекционной концепции атеросклероза бактерии *Chlamydia pneumoniae*. Связь с ИБС, вызванной бактерией *Crip* доказана результатами серологических исследований. После инфицирования атеросклероз развивается без сопутствующей дислипидемии, что является риском развития ишемической болезни сердца[4]. **Выводы:** Выявленная корреляция между значениями иммунологических показателей для первого обследования и их значениями для второго обследования и разностными величинами (характеризующими эффект лечения) доказывает важность иммунных механизмов в развитии коронарогенного повреждения сердца. Создание «генетического паспорта» позволит индивидуально оценить риски развития ишемической болезни сердца у конкретного пациента. Факт инфицирования атеросклероза *Chlamydia pneumoniae* позволит внедрить в клиническую практику методы диагностики данной инфекции у людей с ишемической болезнью сердца.

Источники и литература

- 1) Гладышева Э.В., Гришаев С.Л., Никифоров В.С., Солнцев В.Н. Влияние антител к миокарду на выраженность клинических проявлений при коронарогенной и некоронарогенной патологии сердца // Фундаментальные исследования. 2013. № 11-1. С. 38-47.[1]
- 2) Заглиева С.С. Генетические маркеры у больных хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии // Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. 2016. № 4. С. 17-21.[2]
- 3) Зейгарник М.В. Вклад генов-кандидатов липидного обмена и ожирения в развитие ишемической болезни сердца // Вестник Российского государственного медицинского университета. 2011. № 3. С. 14-20.[3]

- 4) Тарасов А.В., Хирманов В.Н., Дрыгина Л.Б., Куляшова Л.Б. Возможности диагностики инфекции *Chlamydia pneumoniae* у больных ишемической болезнью сердца // Медицинский алфавит. 2016. Т. 2. № 13. С. 58-61.[4]