

**Патогенные мутации в гене HRYR2 у казахстанских пациентов с
желудочковой тахикардией**

Научный руководитель – Акильжанова Айнур Рахметуловна

Абилова Жаннур Максумовна

Выпускник (бакалавр)

Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан

E-mail: zhanpur.nurkina@gmail.com

По данным НИИ кардиологии и внутренних болезней РК в республике зарегистрировано почти два миллиона человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями [1, 2].

Желудочковые аритмии являются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире, что приводит к внезапной сердечной. Генетическая основа болезни была выявлена при определении сцепленности заболевания с хромосомным регионом 1q42 в гене сердечного рецептора рианоина типа 2 (ryanodine type 2receptor(RYR2)) [3, 4].

Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время при изучении ЖТ выявлены достоверные ассоциации с геном hRYR2. Однако исследования различаются по дизайну, проводились на различных популяциях [5, 6].

В связи с этим представляет несомненный интерес изучить вклад генетических вариаций гена hRYR2 в формирование предрасположенности к ЖТ среди населения Казахстана.

В исследование включены больные аритмиями - желудочковой тахикардией. Диагноз верифицировался в Национальном научном кардиохирургическом центре г. Астана. Генотипирование проводилось в Лаборатории геномной и персонализированной медицины ЧУ «National Laboratory Astana» г. Астана.

Для выделения ДНК был использован Wizard® Genomic DNA Purification kit в соответствии с протоколами производителя с некоторой модификацией.

Секвенирование ДНК проводили на приборе 3730XL согласно протоколу производителя. Анализ полученных нуклеотидных последовательностей проводился с использованием пакета программ Applied Biosystems, FinchTVv1.3.1. и с использованием международных баз нуклеотидных последовательностей (Blast, ENSEMBL, Gene Bank и др.). Анализ нуклеотидных последовательностей гена проводили с помощью различных пакетов компьютерных программ, таких как SeqScape 2.5, BLAST, BioEdit.

Проведен скрининг генетических вариантов гена hRYR2 у двух пациентов с CPVT и 14 пациентов с желудочковой тахикардией (VT) в 2012 году и дополнительно у 20 пациентов с ЖТ в 2013 году. Общее количество больных с ЖТ, которым проводился скрининг мутаций в гене hRYR2 составило 36 человек.

Выявлены 2 новые мутации в гене hRYR2 у пациента CPVT (с.А13892Т; р.Д4631V) и у пациента VT (с.Г5428С; р.В1810L). Оба варианта находятся в филогенетически консервативных регионах гена RYR2 и являются патологическими. Также была обнаружена мутация (с.С7511Т; р.Т2504М) у больного ARVD, ранее известная и ассоциированная с развитием ARVD.

Таким образом, данное исследование будет полезно для прогнозирования и профилактики внезапной сердечной смерти и дифференциальной диагностики аритмии в Казахстане.

Источники и литература

- 1) Marks, A.R., Ryanodine receptors/calcium release channels in heart failure and sudden cardiac death. Journal of molecular and cellular cardiology, 2001. 33(4): p. 615-24.
- 2) Priori, S.G., [Evidence that human cardiac myocytes divide after myocardial infarct]. Italian heart journal. Supplement : official journal of the Italian Federation of Cardiology, 2001. 2(11): p. 1248-9. 2.
- 3) <https://www.nur.kz/945272-sovremennoe-sostoyanie-problemy-serd.html>