

Выявление участков, определяющих различную морфологию агрегатов белка ядерного экспорта (NER) вируса гриппа А.

Научный руководитель – Друза Валерий Львович

Головки А.О.¹, Толстова А.П.²

1 - Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет биоинженерии и биоинформатики, Москва, Россия; 2 - Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Кафедра биофизики, Москва, Россия

Белок ядерного экспорта (NER) играет важную роль в жизненном цикле вируса гриппа А. Ранее мы сконструировали бактериальную систему для высокоэффективной экспрессии и выделения рекомбинантного белка NER и его вариантов, содержащих С- или N-концевой (His)₆-тэг (NER-C и NER-N, соответственно). При работе с растворами этих белков оказалось, что NER быстро агрегирует в растворе.

Для определения склонных к агрегации участков в структуре белка, использованы нескольких известных компьютерных методов (TANGO, FoldAmyloid, Pasta 2.0, Waltz и т.д.). Подобные «горячие точки» агрегации находятся как в N- (аа 4-16 и 29-43) так и в С-доме белка (аа 67-82, 93-109 и 113-122). Полученные результаты указывают на возможное преобладающее влияние на процесс агрегации С-домена белка (аа 64-115), в особенности его С2 α -спирали (аа 94-115). Для того, чтобы установить возможный механизм ассоциации NER, провели компьютерное моделирование процесса агрегации в системе, содержащей 50 молекул NER методом молекулярной динамики в программной среде GROMACS 4.6.5. Оказалось, что образовавшиеся после первых 50 нс олигомеры белка (2-4 мономера), ассоциируют с образованием агрегатов 10-20 мономеров. Статистический анализ аминокислотных остатков, вовлеченных в образование межмолекулярных контактов коррелирует с результатами предсказания «горячих точек» агрегации.

Для подтверждения и уточнения результатов моделирования, провели конструирование мутантных вариантов белка, содержащих различные делеции N- и С-концевых участков, методом сайт-специфического мутагенеза. Влияние мутаций, а так же влияние различных внешних факторов (рН, ионная сила, температура) на агрегацию NER изучено методами динамического рассеяния света (ДРС) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Анализ вариантов NER методом АСМ выявил различную морфологию образующихся агрегатов: NER-N формирует сферические агрегаты; в растворе белка NER-C преобладают амилоидо-подобные фибриллы. Измерения ДРС показали, что растворы вариантов белка (природный NER, NER-N, NER-C) содержат три фракции агрегатов с гидродинамическими радиусами 2-15 нм (фракция 1), 100 - 400 нм (фракция 2), и 2000-3000 нм (фракция 3), размер мономера белка (по данным АСМ) $1,2 \pm 0,2$ нм. Вариант белка NER _{Δ 64-85} (удалена α -спираль С1), образует укороченные фибриллы, в растворе присутствует 3 фракции агрегатов; N-домен белка или NER _{Δ 94-115} (удалена С2) образуют небольшие сферические агрегаты. Вариант белка NER₆₄₋₈₅ образует только низкомолекулярную и среднюю фракции агрегатов. Таким образом, было показано, что варианты белка NER образуют агрегаты различной морфологии. Определяющую роль в образовании амилоидо-подобных агрегатов играет С2 α -спираль С-домена белка. Агрегаты многих вирусных белков, образующиеся в инфицированных клетках, необходимы для развития инфекции. Вероятно, что подобные агрегаты белка NER могут выполнять определенную функцию в жизненном цикле вируса гриппа А.

Работы поддержана РФФИ, грант № 16-04-00563.