

Глубокая модель селекции Т-клеточных рецепторов

Научный руководитель – Горбачев Дмитрий Викторович

Офицеров Евгений Петрович

Аспирант

Тульский государственный университет, Тула, Россия

E-mail: eofitserov@gmail.com

Адаптивный иммунитет играет важнейшую роль в защите организма от различных патогенов. В настоящее время благодаря развитию технологий секвенирования появилась возможность извлекать данные о нуклеотидных последовательностях, кодирующих Т-клеточные рецепторы, и использовать их для количественного моделирования иммунной системы.

Ранее в работе [2] была предложена модель тимической селекции Т-клеточных рецепторов. В ней вероятность селекции предсказывается на основе длины аминокислотной последовательности, уникальной комбинации VJ генов и распределения аминокислот по позициям в последовательности. Параметры модели выводятся на основе данных о распределении Т-клеточных рецепторов, полученных с помощью многопоточного секвенирования, а также вероятностной модели процесса V(D)J рекомбинации, описанной в работе [1]. В предложенной модели делается предположение об условной независимости аминокислот в гипервариабельной части рецептора. Это является ее существенным недостатком.

В данной работе предлагается более точная контекстно-зависимая модель тимической селекции на основе глубоких нейронных сетей. Кроме того, разработан эффективный алгоритм обучения этой модели на основе экспериментальных данных.

В предлагаемой модели вероятность того, что рецептор пройдет селекцию, описывается с помощью двунаправленной рекуррентной нейронной сети. Отметим, что рекуррентные сети зарекомендовали себя как эффективный подход при описании последовательностей, позволяя учитывать контекст произвольного размера. Для вывода параметров такой модели, также как в работе [2], использовалось два набора рецепторов: репертуар, полученный с помощью секвенирования, и выборка из 3,000,000 случайных последовательностей, полученных с помощью вероятностной модели V(D)J рекомбинации (см. [1]). Обучение модели заключается в максимизации правдоподобия экспериментальной выборки. Для использования при обучении стандартных градиентных методов был разработан подход, в котором для оценки нормализующей константы (см. [2]) выполняется повторное семплирование по Гиббсу из множества сгенерированных последовательностей. Такой подход позволяет обучать различные архитектуры нейронных сетей и значительно лучше предсказывать давление селекции на различные рецепторы.

Источники и литература

- 1) 1. Anand Murugan et al. 2012. Statistical inference of the generation probability of T-cell receptors from sequence repertoires. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109, 40, 16161–16166. Jorge Nosedal, Stephen J. Wright. 2006.
- 2) 2. Yuval Elhanati et al. 2014. Quantifying selection in immune receptor repertoires. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111, 27, 9875–9880.