

**Биоморфологический анализ и встречаемость лекарственных растений
веденского и шатойского районов Чеченской Республики**

Алдамов Расамбек Ризванович

Студент (бакалавр)

Чеченский государственный университет, Грозный, Россия

E-mail: rasambekaldamov21@gmail.com

Научный руководитель - Ириханова Зазу Имрановна

Аннотация. В научной работе представлен систематический, биоморфологический анализы, встречаемость лекарственных растений окрестности Веденского и Шатойского районов. Анализ основан на обработке гербарного материала и полевых наблюдениях авторов. Лекарственные растения привлекают внимание специалистов - ботаников, специалистов по ресурсам, врачей, фармацевтов.

Ключевые слова: лекарственный вид, вид, род, семейство, структура, биоморфа, встречаемость.

Введение. Веденский и Шатойский районы расположены на юге республики. Общая площадь района Веденского района составляет 952 кв.км. Площадь Шатойского района составляет 82420 га. Особенности гор: на южных и восточных склонах скалистые, а с запада и с севера – лесистые и с альпийскими лугами.

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования заключается в исследовании лекарственной флоры Веденского и Шатойского районов, проведение систематического анализа данной флоры, анализ жизненных форм и анализ встречаемости [1,3,4,5].

Мегофанерофитов (Phmg) всего 5 видов (3%): Липа широколистная, Ясень обыкновенный, Тополь дрожащий (Осина), Липа кавказская, Сосна Сосновского [2,5,6].

Мезофанерофитов (Phms) всего 10 видов (5%): Шелковица чёрная, Ольха серая, Береза плакучая, Дуб скальный, Ольха клейкая, Дуб черешчатый, Орех грецкий, Шелковица белая, Рябина обыкновенная, Яблоня восточная [2,5,6].

Микрофанерофитов (Phm) – всего 9 видов (5%): Боярышник однопестичный, Жостер слабительный, Слива растопыренная (Алыча), Боярышник согнуточашелистниковый, Кизил обыкновенный, Боярышник пятипестичный, Мушмула германская, Ива козья, Черёмуха обыкновенная. [2,5,6].

Нанофанерофитов (Phn) насчитывает 19 видов (10%): Скуппия кожевническая, Можжевельник продолговатый, Можжевельник казацкий, Барбарис обыкновенный, Бересклет европейский, Крыжовник отклонённый, Лещина обыкновенная, Облепиха крушиновидная, Рододендрон кавказский, Бирючина обыкновенная и др. [2,5,6].

Хамефитов (Ch) около 10 видов (5%): Толочнянка кавказская, Баранец обыкновенный, Плаун годичный, Эфедрa рослая, Дубровник обыкновенный, Жимолость каприфоль, Дубровник белый, Курильский чай кустарниковый, Малина Буша, Чабрец Маршаллов. [2,5,6].

Гемикриптофитов (НК) насчитывается 92 вида (48%): Щитовник схожий, Щитовник мужской, Многоножка обыкновенная, Кочедыжник женский, Щитовник Картузиуса, Башмачок настоящий, Синеголовник плосколистный, Болиголов пятнистый, Сныть обыкновенная, Порезник кавказский, Тмин обыкновенный, и др. [2,5,6].

Криптофитов (К) всего 28 видов (14%): Лук медвежий (Черемша), Хвощ полевой, Подснежник узколистный, Подснежник кавказский, Ятрышник обожжённый, Чемерица Лобеля, Любка зеленоцветная, Безвременник великолепный, Гусиный лук жёлтый, Тамус обыкновенный (Адамов корень) и др. [2,5,6].

Терифитов (Т) насчитывается 19 видов (10%): Блошница обыкновенная, Селезёночник очереднолистный, Бородавник обыкновенный, Крупка перелесковая, Фиалка полевая Звёздчатка средняя и др. [2,5,6].

Обычно встречаются 113 видов: Фиалка душистая, Калина обыкновенная, Липа кавказская, Вероника дубравная, Селезёночник очереднолистный, Бузина чёрная, Ива козья, Рябина обыкновенная, Ежевика сизая и др.

Рассеянно встречается 62 вида: Фиалка полевая, Волчеягодник обыкновенный, Дурман обыкновенный, Вероника поточная, Коровяк лекарственный, Лёнчанка обыкновенная, Бузина травянистая и др.

Редко встречается 20 видов: Липа широколистная, Красавка кавказская, Курильский чай кустарниковый, Щавель конский, Толокнянка кавказская и другие.

Очень редко встречаются 6 видов: Подснежник узколистный, Башмачок настоящий, Ятрышник пурпурный, Грушанка круглолистная, Ятрышник обезьяний и Морозник кавказский.

Выводы. При проведении биоморфологического анализа окрестностей Веденского и Шатойского районов было выявлено, что наибольшее количество видов (92) являются гемикриптофитами, на втором месте криптофиты – 28 видов. Третье место занимают нанофанерофиты и терифиты, по 19 видов в каждом. При проведении анализа встречаемости обычно встречаются 113 видов, рассеянно 62, редко 20 видов и очень редко 6 вида.

Источники и литература

- 1) Галушко А.И. Флора Северного Кавказа (определитель). 1–3 т. Ростов, 1978–1980 г.: 1978. Т.1. – 317 с.; 1980. Т.2. – 350 с.; 1980. Т.3. – 327 с.
- 2) Гвоздецкий Н.А. Физическая география Кавказа. – М.: Изд-во МГУ, 1954. – 208 с.
- 3) Красная книга ЧР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. – Грозный, 2007. – 432 с.
- 4) Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. – М.: Высшая школа, 1962. – 378 с.
- 5) Умаров М.У., Тайсумов М.А. Конспект флоры Чеченской Республики. – Грозный, 2011. – 152 с.
- 6) Шенников А.Л. Экология растений. – М., 1950. – 290 с.